



ຜົນກະທົບຂອງການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າໃນໄລຍະຖືພາ



ສ່ຽງຕໍ່ການລຸລຸກ

ແມ່ຍິງຖືພາ ຫາກດື່ມທາດເຫຼົ້າ ຕັ້ງແຕ່ 2-3 ເດືອນທຳອິດ ຂອງການຖືພາ ອາດຈະມີພາວະສ່ຽງຕໍ່ການລຸລຸກ ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນອາຍຸຖືພາ 20 ອາທິດ

ສ່ຽງເດັກຕາຍໃນທ້ອງ

ໄລຍະທ້າຍໄຕມາດ 2-3 ຂອງການຖືພາ ຫາກແມ່ຍິງດື່ມທາດເຫຼົ້າອາດຈະເກີດພາວະສ່ຽງລຸກຕາຍ ໃນທ້ອງໄດ້

ເດັກເກີດກ່ອນກຳນົດ

ການດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແມ່ນເພີ່ມມີໂອກາດ ເດັກເກີດກ່ອນກຳນົດ ເຊິ່ງອາດ ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາສຸຂະພາບຕາມມາຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການຫາຍໃຈ, ເລື່ອງຄວາມ ສົມບູນຂອງປອດ ແລະ ອື່ນໆ

ບັນຫາສຸຂະພາບເດັກ

ເດັກອາດພົບບັນຫາກ່ຽວກັບ ຫົວໃຈ ຫຼື ໄຂ່ຫຼັງ, ນອກຈາກນີ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ການໄດ້ຍິນອີກດ້ວຍ

ພາວະອາການຜິດປົກກະຕິ

1. ທາງດ້ານສະໝອງ: ສະໝອງພິການ
2. ຮ່າງກາຍ: ຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ພິການ
3. ພຶດຕິກຳ: ຄວາມຈື່ຈຳບໍ່ໄດ້ດີ, ສະມາທິສິ້ນ
4. ນ້ຳໜັກເດັກຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິ
5. ເນື້ອສະໝອງລົບ, ຮູບໜ້າເດັກຜິດປົກກະຕິ
6. ບໍ່ມີຮ່ອງດັງ, ຮິມສົບບາງ ແລະ ຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ

